Zmienność genetyczna człowieka

Zmienność prawidłowa i choroby wieloczynnikowe

www.igib.uw.edu.pl prezentacja

Różnorodność genetyczna człowieka

- Projekt “1000 genomów” – poszukiwanie różnic w genomach różnych ludzi (2500 osób)
- Dane (2015):
  - 84,7 mln. miejsc zmiennych (SNP)
  - 3,6 mln. indeli
  - 60 000 wariantów strukturalnych (duże delecje/insercje, rearanżacje)

- Więcej nukleotydów, niż w całym genomie drożdży

A global reference for human genetic variation

The 1000 Genomes Project Consortium*

NATURE | VOL 526 | 1 OCTOBER 2015

IGSR: The International Genome Sample Resource

Providing ongoing support for the 1000 Genomes Project data



Home | About | Data | Portal | Analysis | Contact | Browser | FAQ

Search 1000genomes

IGSR and the 1000 Genomes Project

Populations: - African; - American; - East Asian; - European; - South Asian;

The International Genome Sample Resource (IGSR) was established to ensure the ongoing usability of data generated by the 1000 Genomes Project and to extend the data set. More information is available about the IGSR.

Links

Announcements

IGSR Sample Collection Principles

1000 Genomes Project Publications

File formats

Software tools

Download data

User survey

Twitter

http://www.internationalgenome.org/

Projekt 1000 genomów

A global reference for human genetic variation

The 1000 Genomes Project Consortium*

NATURE | VOL 526 | 1 OCTOBER 2015

Table 1 | Median autosomal variant sites per genome

	AFR		AMR		EAS		EUR		SAS	
Samples	661		347		504		503		489	
Mean coverage	8.2		7.6		7.7		7.4		8.0	
	Var. sites	Singletons	Var. sites	Singletons	Var. sites	Singletons	Var. sites	Singletons	Var. sites	Singletons
SNPs	4.31M	14.5k	3.64M	12.0k	3.55M	14.8k	3.53M	11.4k	3.60M	14.4k
Indels	625k	-	557k	-	546k	-	546k	-	556k	-
Large deletions	1.1k	5	949	5	940	7	939	5	947	5
CNVs	170	1	153	1	158	1	157	1	165	1
MEI (Alu)	1.03k	0	845	0	899	1	919	0	889	0
MEI (L1)	138	0	118	0	130	0	123	0	123	0
MEI (SVA)	52	0	44	0	56	0	53	0	44	0
MEI (MT)	5	0	5	0	4	0	4	0	4	0
Inversions	12	0	9	0	10	0	9	0	11	0
Nonsynon	12.2k	139	10.4k	121	10.2k	144	10.2k	116	10.3k	144
Synon	13.8k	78	11.4k	67	11.2k	79	11.2k	59	11.4k	78
Intron	2.06M	7.33k	1.72M	6.12k	1.68M	7.39k	1.68M	5.68k	1.72M	7.20k
UTR	37.2k	168	30.8k	136	30.0k	169	30.0k	129	30.7k	168
Promoter	102k	430	84.3k	332	81.6k	425	82.2k	336	84.0k	430
Insulator	70.9k	248	59.0k	199	57.7k	252	57.7k	189	59.1k	243
Enhancer	354k	1.32k	295k	1.05k	289k	1.34k	288k	1.02k	295k	1.31k
TFBSs	927	4	759	3	748	4	749	3	765	3
Filtered LoF	182	4	152	3	153	4	149	3	151	3
HGMD-DM	20	0	18	0	16	1	18	2	16	0
GWAS	2.00k	0	2.07k	0	1.99k	0	2.08k	0	2.06k	0
ClinVar	28	0	30	1	24	0	29	1	27	1

Różnorodność genetyczna ludzi jest stosunkowo niewielka



2 Phylogenetic tree of 70 human, 30 chimpanzee, 5 bonobo, 11 gorilla and 14 orang-utan Xq13.3 DNA sequences.

Kassemann & Pääbo, 2002, J. Int. Med. 251:1-18

Różnorodność genetyczna ludzi jest stosunkowo niewielka



Fig. 11 DNA sequence diversity within humans and great apes. Values are based on the number of variable positions within each species taking the number of sequences determined into account (Watterson's diversity estimator, θ_w).

Kassemann & Pääbo, 2002, J. Int. Med. 251:1-18

Projekt 1000 genomów

A global reference for human genetic variation

The 1000 Genomes Project Consortium*

NATURE | VOL 526 | 1 OCTOBER 2015



Genom i medycyna

- Poszukiwanie mutacji sprawczych
  - choroby jednogenowe (mendlowskie) są rzadkie
- Poszukiwanie genetycznego podłoża cech wielogenowych
  - częste choroby to cechy wielogenowe
  - genetyczne podłoże zmienności prawidłowej
- Badanie zmian genetycznych w nowotworach
  - zmiany somatyczne

Cechy jednogenowe zmienności prawidłowej

- Bardzo nieliczne przykłady
- Większość “podręcznikowych” przykładów to uproszczenia (np. płatek ucha, zwijanie języka)
- Przykłady:
  - M1CR - receptor melanokortyny 1 (receptor MSH), rude włosy, jasna skóra, piegi, podatność na czerniaka
  - OR6A2 - wariant genu (~17% w Europie) powoduje negatywną reakcję smakową na związki (aldehydy) występujące w świeżej naci kolendry

Cechy zależne od niewielkiej liczby genów - pigmentacja

- System HIrisPlex
- 24 loci
- przewidywanie koloru oczu, włosów i pigmentacji skóry
- >86% dokładność
  - najwyższa dla włosów rudych, najniższa dla jasnych
- Genetyczny rysopis
  - można też przewidywać:
    - skłonność do łysienia
    - wiek (na pods. metylacji DNA)

Branicki & Keyser, 2015



Cechy wieloczynnikowe



Cechy wieloczynnikowe

- Częste choroby, odziedziczalna część ryzyka
  - np. nowotwory (nie dziedziczne)
  - choroby serca i układu naczyniowego
  - cukrzyca
  - choroby psychiczne
- Prawidłowa zmienność fenotypowa

- Za odziedziczalność muszą też odpowiadać częste warianty sekwencyjne (częste polimorfizmy)

Cechy wieczoczynnikowe a mendlowskie

Mendlowskie	Wieloczynnikowe
Proste dziedziczenie, allele pojedynczych genów, wysoka penetracja	Złożone dziedziczenie: wiele czynników (genetycznych i środowiskowych), każdy z nich osobno ma niską penetrację
Mutacja powoduje chorobę	Polimorfizymy genów wpływają na ryzyko (zwiększają albo zmniejszają)
Badanie: analiza sprzężeń, sekwencjonowanie	Badanie: metody statystyczne, głównie nieparametryczne
Rzadkie choroby	Wiele częstych chorób i cech prawidłowych

Odziedziczalność

- Za każdy fenotyp odpowiada interakcja genotypu ze środowiskiem
- Odziedziczalność: proporcja zmienności fenotypowej wyjaśnianej zmiennością genetyczną w populacji
  - badania bliźniąt
    - monozygotyczne (MZ) vs. dizygotyczne (DZ)
  - agregacja rodzinna
    - częstość objawów u krewnych I stopnia przewyższa obserwowaną u dalszych krewnych i osób niespokrewnionych

Nieporozumienia dotyczące odziedziczalności

- Nie jest to miara udziału cech dziedzicznych w fenotypie
  - jest to miara udziału cech dziedzicznych w zmienności fenotypu
  - kowariancja genotypu i fenotypu

Nieporozumienia dotyczące odziedziczalności

- Nie jest to miara podobieństwa potomstwa i rodziców
  - np. typowe choroby autosomalne recesywne: chore dzieci zdrowych rodziców, 100% odziedziczalność

Nieporozumienia dotyczące odziedziczalności

- Nie jest to własność cechy
  - zależy od struktury populacji, środowiska itp.
  - W populacji jednolitej genetycznie (klony) całość zmienności cechy jest spowodowana zmianami środowiska - 0% odziedziczalności

Agregacja rodzinna

- Czy cecha występuje częściej u krewnych osób mających tę cechę



Agregacja rodzinna

- Choroby afektywne (ostre cykliczne zaburzenia nastroju)
  - jednobiegunowa (epizody depresyjne)
  - dwubiegunowa (epizody maniakalne i depresyjne)

Agregacja rodzinna

- Choroba jednobiegunowa
  - ryzyko w populacji ~3 % (mężczyźni) ~5-9% (kobiety)
  - krewni I stopnia osoby chorej – ryzyko ~10%
  - stosunkowo mała odziedziczalność
- Choroba dwubiegunowa
  - ryzyko w populacji ~1%
  - krewni I stopnia osoby chorej – ryzyko ~ 20%
  - istotna odziedziczalność

Agregacja rodzinna

$$\lambda_S = \frac{\text{ryzyko dla krewnych 1 stopnia chorych}}{\text{ryzyko w populacji}}$$

λ_S – *recurrence risk ratio*

Np.

populacja	***0,8***
krewni I stopnia chorych	***8,5***

$\lambda_S = 10,6$

Agregacja rodzinna

- Przykładowe wartości λ_S
- Choroby mendlowskie:
  - mukowiscydoza: 0,25/0,0004 = 500
  - choroba Huntingtona: 0,5/0,0001 = 5000
- Choroby wieloczynnikowe
  - autyzm: ~ 110
  - stwardnienie rozsiane: ~25
  - schizofrenia: ~10
  - cukrzyca typ I (IDDM): ~15
  - cukrzyca typ II (NIDDM): ~3,5

Asocjacja

- Nieprzypadkowe współwystępowanie czynników (alleli i fenotypów) na poziomie populacji
    - Czy zawsze asocjacja oznacza zależność przyczynową?
    - Czy każda asocjacja ma wartość diagnostyczną?
    - Czy asocjacja odkrywa “gen na ....”?

Asocjacje mogą być zwodne

- Allel 3A4 cytochromu P450 (CYP3A) i rak prostaty (bardziej zaawansowana postać w momencie diagnozy)
- CYP3A może w pływać na tempo hydroksylowania testosteronu - związek przyczynowy?
- Nie ma wpływu allelu 3A4 na kinetykę metabolizmu testosteronu
- Allel 3A4 częściej występuje u ludzi pochodzenia afrykańskiego (Afroamerykanie), niż europejskiego
- Podobne korelacje dla raka prostaty dla innych alleli częstszych w populacji afrykańskiej
- Bardziej zaawansowany rak prostaty u Afroamerykanów (przyczyny społeczne)?

Asocjacja

- Zależności funkcjonalne
  - często z allelami MHC (HLA) - związane z funkcjonowaniem układu odpornościowego
  - poszukuje się asocjacji dla bardzo intensywnie poznawanych polimorfizmów SNP w genomie człowieka
  - farmakogenetyka i farmakogenomika – polimorfizmy a działanie leków
    - CRHR1 (receptor kortykotropiny) - skuteczność terapii kortykosteroidami w leczeniu astmy
    - HLA-B27 - nadwrażliwość na skutki uboczne Abcaviru
    - HTR2A (serotonina 2A) - reakcja na środki antydepresyjne

Zesztywniające zapalenie stawów



Asocjacja - przykład

HLA-B27 i choroby autoimmunologiczne, np. zesztywniające zapalenie stawów

	Chorzy	Zdrowi
HLA-B27 +	90	1000
HLA-B27 -	10	9000

Ryzyko 8%

Ryzyko 0,11%

Ryzyko dla całej populacji ~1%

test statystyczny Fishera (Fisher exact test):
$p \approx 2 \cdot 10\text{-}76$

Geny na...?

Gazeta.pl Wiadomości

Szukaj w serwisie w internecie RAPORTY: E

POLITYKA | POLSKA | ŚWIAT | KULTURA | NAUKA | SPORT | PRASA | POLITBIURO | CI

Gazeta.pl ▸ Wiadomości ▸ Wiadomości dnia

A A A

Odkryto gen odpowiedzialny za choroby psychiczne

rik, IAR

2009-11-26, ostatnia aktualizacja 2009-11-26 17:15

Naukowcy odkryli gen odpowiedzialny za skłonności do chorób psychicznych. Z badań przeprowadzonych na uniwersytecie w Edynburgu wynika, że ABCA13 jest częściowo nieaktywny u pacjentów cierpiących między innymi na schizofrenię, depresję i chorobę afektywną dwubiegunową.

Fot. Jarosław Kubalski / AG

Gen reguluje te funkcje mózgu, które są zaburzone u osób chorych psychicznie. Naukowcy z Edynburga są przekonani, że to odkrycie jest przełomowe w rozumieniu przyczyn schorzeń psychicznych.

Może też pomóc w opracowaniu nowych leków i metod terapii. Odkrycie jest owocem pracy międzynarodowej grupy badawczej na uniwersytecie w Edynburgu. Naukowcy przebadali 2 tysiące pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i taką sama liczbę zdrowych osób.

ZOBACZ TAKŻE

- Likwidują ośrodek. Co się stanie z chorymi?
- Z zaburzeniami psychicznymi częściej w szpitalu

Alert24: Wyślij nam newsa, zdjęcia albo wideo! | SMS/MMS 605242424 | Czekają nagrody

Ocena: 12 głosów

Najświeższe wiadomości w Twojej komórce m.Gazeta.pl

Geny na …?

BBC News Sport Weather Capital TV Radio More... Search BBC News

NEWS LIVE BBC NEWS CHANNEL

News Front Page
Africa
Americas
Asia-Pacific
Europe
Middle East
South Asia
UK
England
Northern Ireland
Scotland
Wales
UK Politics
Education

Page last updated at 10:13 GMT, Thursday, 26 November 2009

E-mail this to a friend Printable version

'Mental illness gene' discovered by Scots scientists

Scientists have discovered a gene which may help explain the causes of mental illness.

The ABCA13 gene is partially inactive in patients with severe psychological conditions such as schizophrenia, bipolar disorder and depression.

The discovery could lead to new treatments being developed

It is hoped that identifying genes which make people more likely to develop psychiatric illness may lead to new treatments being developed.

SEE ALSO
- 'Doctors should stop pushing drugs at depressed people'
  25 Nov 09 | Health
- Physical problems 'often mental'
  14 Oct 09 | Health

RELATED BBC LINKS
- Mental Health
- Headroom

RELATED INTERNET LINKS
- Edinburgh University

A w rzeczywistości…

Copyright © 2009 The American Society of Human Genetics. All rights reserved.
The American Journal of Human Genetics, 25 November 2009
doi:10.1016/j.ajhg.2009.11.003

ARTICLE

A Cytogenetic Abnormality and Rare Coding Variants Identify *ABCA13* as a Candidate Gene in Schizophrenia, Bipolar Disorder, and Depression

Abstract

Schizophrenia and bipolar disorder are leading causes of morbidity across all populations, with heritability estimates of ~80% indicating a substantial genetic component. Population genetics and genome-wide association studies suggest an overlap of genetic risk factors between these illnesses but it is unclear how this genetic component is divided between common gene polymorphisms, rare genomic copy number variants, and rare gene sequence mutations. We report evidence that the lipid transporter gene *ABCA13* is a susceptibility factor for both schizophrenia and bipolar disorder. After the initial discovery of its disruption by a chromosome abnormality in a person with schizophrenia, we resequenced *ABCA13* exons in 100 cases with schizophrenia and 100 controls. Multiple rare coding variants were identified including one nonsense and nine missense mutations and compound heterozygosity/homozygosity in six cases. Variants were genotyped in additional schizophrenia, bipolar, depression ($n > 1600$), and control ($n > 950$) cohorts and the frequency of all rare variants combined was greater than controls in schizophrenia (OR = 1.93, $p = 0.0057$) and bipolar disorder (OR = 2.71, $p = 0.00007$). The population attributable risk of these mutations was 2.2% for schizophrenia and 4.0% for bipolar disorder. In a study of 21 families of mutation carriers, we genotyped affected and unaffected relatives and found significant linkage (LOD = 4.3) of rare variants with a phenotype including schizophrenia, bipolar disorder, and major depression. These data identify a candidate gene, highlight the genetic overlap between schizophrenia, bipolar disorder, and depression, and suggest that rare coding variants may contribute significantly to risk of these disorders.

Dla porównania

	Chorzy	Zdrowi
HLA-B27 +	90	1000
HLA-B27 -	10	9000

Ryzyko 8%

Ryzyko 0,11%

test statystyczny Fishera (Fisher exact test):
p≈2·10-76

$$OR = \frac{\frac{90}{1000}}{\frac{10}{9000}} = 81$$

Ważne!!

- Asocjacja to nie jest “gen na...”!
- Czynnik ryzyka nie ma zwykle znaczenia diagnostycznego
  - Może być przydatny w diagnostyce różnicowej
- Zawsze należy analizować asocjację na tle ogólnego ryzyka w populacji, jakie są wartości bezwzględne

O korelacji i wynikaniu…

O korelacji i przyczynowości…



Populacja okolic Oldenburga, 1930-1936, za
Richard F. Mould “Introductory Medical Statistics”

O korelacji i przyczynowości…





O korelacji i przyczynowości…



Zrobiliście listę noworocznych postanowień? Genetycy tłumaczą, dlaczego ich nie dotrzymacie

Dostępne badania:

* ciąża - pokazuje predyspozycje genetyczne w zakresie przyswajania witamin: kwasu foliowego i witaminy D. To składniki ważne dla matki i dziecka,

* otyłość - przeznaczone zarówno dla osób, które borykają się z problemem nadwagi, jak i tych, które chciałyby jej uniknąć. Sprawdza genetyczne predyspozycje do zaburzeń metabolizmu lub złych nawyków żywieniowych,

* stres - wskazane dla każdego, kto chce sprawdzić swoje predyspozycje do radzenia sobie ze stresem,

* talent - dla każdego, kto chce poznać i zrozumieć otrzymane w genach predyspozycje fizyczne, psychiczne lub intelektualne,

Choroby serca?

temu łatwo mogły określić, na co powinni uważać konkretni zawodnicy. Piłkarz Lilian Thuram zakończył karierę w 2008 roku, po tym jak badania genetyczne wykazały, że ma skłonność do chorób serca. Takie problemy miała jego matka, a brat umarł w młodym wieku na zawał serca. Stwierdził, że nie ma co ryzykować. W końcu lista piłkarzy, którzy zmarli na boisku, jest bardzo długa - mówi naukowiec. Podkreśla też, że badania genetyczne powinny być obowiązkowe. Wprowadzenie ich zaraz po urodzeniu pozwoliłoby uratować wiele osób. - Mam u siebie badania kardio, gdzie oznaczam chromosom 9, czyli rejon, który mocno wpływa na choroby serca. W Polsce każdego dnia umiera na nie 500 osób, a 100 innych ma zawał, który kończy się śmiercią. Dzięki badaniom dowiadujemy się, jak wielkie jest ryzyko wystąpienia tych chorób i jak sobie pomóc. Ludzie kupują zegarki mierzące tętno czy kroki, a nie interesują się genetyką. Przecież badania to taka wydrukowana instrukcja życia.

Choroby serca?

- Lilian Thuram choruje na rodzinną kardiomiopatię rozstrzeniową
- Forma rodzinna (genetyczna) ~50% wszystkich przypadków KR
- Obszar na chromosomie 9 - jeden z kilku powiązanych z chorobą
- Częstość KR: 1/2500 osób

Taylor i wsp. Orphanet Journal of Rare Diseases 2006 1:27 DOI: 10.1186/1750-1172-1-27

Choroby serca?

- Test chr. 9 wykrywa jeden z kilku genów stosunkowo rzadkiej genetycznej choroby serca
- Wiązanie go z zawałem (zupełnie inna choroba) i innymi częstymi chorobami serca - ????

temu łatwo mogły określić, na co powinni uważać konkretni zawodnicy. Piłkarz Lilian Thuram zakończył karierę w 2008 roku, po tym jak badania genetyczne wykazały, że ma skłonność do chorób serca. Takie problemy miała jego matka, a brat umarł w młodym wieku na zawał serca. Stwierdził, że nie ma co ryzykować. W końcu lista piłkarzy, którzy zmarli na boisku, jest bardzo długa - mówi naukowiec. Podkreśla też, że badania genetyczne powinny być obowiązkowe. Wprowadzenie ich zaraz po urodzeniu pozwoliłoby uratować wiele osób. - Mam u siebie badania kardio, gdzie oznaczam chromosom 9, czyli rejon, który mocno wpływa na choroby serca. W Polsce każdego dnia umiera na nie 500 osób, a 100 innych ma zawał, który kończy się śmiercią. Dzięki badaniom dowiadujemy się, jak wielkie jest ryzyko wystąpienia tych chorób i jak sobie pomóc. Ludzie kupują zegarki mierzące tętno czy kroki, a nie interesują się genetyką. Przecież badania to taka wydrukowana instrukcja życia.

Przyczyny asocjacji alleli

- Struktura populacji (ukryta zmienna)

- Paradoks Simpsona: Jeżeli zmieszamy dwie populacje, w których nie występuje asocjacja markera i choroby, ale są różne częstości występowania choroby (oraz markera), w zmieszanej populacji pojawi się asocjacja markera z chorobą (problem ukrytej zmiennej).

- Należy badać populacje jednorodne etnicznie, a nawet tylko pojedyncze duże rodziny

Paradoks Simpsona - przykład

Prosty przykład: uniwersytet powinien faworyzować kobiety przy przyjmowaniu na studia doktoranckie:

	Mężczyźni	Kobiety
Historia	1/5 (20%)	2/8 (25%)
Geografia	6/8 (75%)	4/5 (80%)
Razem	7/13 (54%)	6/13 (46%)

Przykład medyczny

Porównywano dwie terapie kamieni nerkowych

Terapia A	Terapia B
78 % (273/350)	83% (289/350)

Ale:

	Terapia A	Terapia B
Małe kamienie	93% (81/87)	87% (234/270)
Duże kamienie	73% (192/263)	69% (55/80)
Razem	78 % (273/350)	83% (289/350)

Terapię A częściej stosowano u pacjentów z dużymi kamieniami, które trudniej się leczy.

Podwójna ślepa próba

- Przy badaniach działania leków. terapii itp.
  - Terapia vs. placebo; nowa terapia vs. dotychczasowa, itp.
- Ani pacjent, ani lekarz oceniający efekty nie wie, do której grupy należy dany pacjent
- Standardy EBM (*Evidence Based Medicine*)

Genetyczne czynniki ryzyka

- Badania GWAS – asocjacje na skalę genomu
- Korelacja wariantów genetycznych z ryzykiem choroby
- Znajduje się wiele korelacji, ale żadna nie może być decydującym czynnikiem
- Tajemnica brakującej odziedziczalności

Badanie Wellcome Trust 2005-2007

- GWAS – *genome-wide association study*
- 7 ważnych schorzeń wieloczynnikowych, 17 000 osób (chorych i zdrowych), 200 badaczy, 9 milionów funtów
- Jeden z kilku dużych projektów GWA, których wyniki opublikowano w 2007 r.

Wyniki badań Wellcome Trust

- Choroba afektywna dwubiegunowa
  - Wiele asocjacji, ale żadna bardzo istotna
- Choroba wieńcowa
  - Kilka loci znacznie zwiększających ryzyko, w tym locus na chr. 9 o 50% u heterozygot i dwukrotnie u homozygot
- Choroba Crohna
  - Odkryto warianty w 3 genach zwiększające ryzyko (RGM, NKX2-3 i PTPN2) oraz zawierający 7 nowych genów obszar

Wyniki badań Wellcome Trust

- Nadciśnienie
  - Brak wyraźnych czynników ryzyka - liczne warianty o stosunkowo małym wpływie
- Reumatoidalne zapalenie stawów
  - Odkryto czynniki ryzyka związane z polimorfizmami w kilku genach
  - Korelacja z chorobami serca i cukrzycą typu I

Wyniki badań Wellcome Trust

- Cukrzyca typu I
  - Odkryto 4 nowe genetyczne czynniki ryzyka, w tym gen PTPN2(choroba Crohna)
  - W sumie znanych jest już co najmniej 10 takich genów
- Cukrzyca typu II
  - Kilka nowych czynników ryzyka
  - Gen FTO - efekt pośredni, wpływa na ryzyko otyłości
  - Geny CDKAL1, CDKN2A i IGF2BP2-efekt bezpośredni
  - Potwierdzenie asocjacji dla kilku genów odkrytych w innych badaniach - w sumie ~10 genów

Powtarzalność badań asocjacji

TABLE 26.2. How replicable are association studies?

Associated Gene, Phenotype	Number of Studies (Total)	Number of Studies ($p < 0.05$) Same Direction as Original Report	Number of Studies ($p < 0.05$) Opposite Direction as Original Report
ABCC8, type 2 diabetes[a]	9	1	1
***ABCC8*, type 2 diabetes**[a]	**4**	**2**	**0**
***ADD1*, hypertension**	**18**	**5**	**2**
APOE, schizophrenia	12	0	1
BLMH, Alzheimer's disease	5	0	0
***COL1A1*, osteoporotic fracture**	**12**	**5**	**0**
COMT, bipolar disorder	12	0	0
COMT, schizophrenia	9	0	1
***CTLA4*, type 1 diabetes**	**20**	**8**	**0**
***DRD2*, schizophrenia**	**8**	**2**	**1**
***DRD3*, schizophrenia**	**48**	**5**	**2**
GSTM1, breast cancer	15	0	0
***GSTM1*, head/neck cancer**	**25**	**3**	**1**
GYS1, type 2 diabetes	3	0	1
***HTR2A*, schizophrenia**	**28**	**3**	**1**
INSR, type 2 diabetes	4	1	0
INSR, type 2 diabetes	4	0	0
KCNJ11, type 2 diabetes	6	0	0
NTF3, schizophrenia	7	0	0
***PON1*, coronary artery disease**	**14**	**5**	**0**
***PPARG*, type 2 diabetes**	**14**	**4**	**1**
SERPINE1, myocardial infarction	13	1	0
***SLCA1*, type 2 diabetes**	**3**	**2**	**0**
SLCA2, type 2 diabetes	3	0	0
TPH, bipolar disorder	5	0	0
Total	**301**	**47**	**12**

Evolution © 2007 Cold Spring Harbor Laboratory Press

Badania asocjacji



Genome-wide association studies for complex traits: consensus, uncertainty and challenges

Mark I. McCarthy[*‡], Gonçalo R. Abecasis[§], Lon R. Cardon*[‖], David B. Goldstein[¶], Julian Little[#], John P. A. Ioannidis*[**‡‡] and Joel N. Hirschhorn[§§‖‖¶¶]*

Nat Rev Genet, 2008 vol. 9 (5) pp. 356-369

Luka odziedziczalności

- “Missing heritability”
- Klasyczne badania wykazują znaczną odziedziczalność wielu cech wieloczynnikowych
- Badania asocjacyjne wykazują jedynie niewielki wzrost prawdopodobieństwa dla danego polimorfizmu (np. badania asocjacji tłumaczą tylko 5% różnic wzrostu)
- Za odziedziczalność złożonych cech wieloczynnikowych odpowiadają interakcje genetyczne wielu polimorfizmów

Brakująca odziedziczalność

- “Ciemna materia” genomu
- Wykrywane asocjacje wyjaśniają kilka % odziedziczalności
- Możliwe odpowiedzi:
  - Inne, jeszcze nie opisane (rzadkie) warianty
    - pomóc może projekt 1000 genomów
  - Oddziaływania wielu wariantów między sobą
    - pomóc mogą teoretycy opisujący sieci zależności
  - Zmienność liczby kopii

Zmienność liczby kopii

- Niekiedy dotyczy obszarów zawierających geny

- Ludzie o diecie wysokoskrobiowej - więcej kopii genu kodującego enzym rozkładający skrobię (amylaza, gen *AMY1*) w porównaniu z ludźmi o diecie niskoskrobiowej

“Jeden gen – jedna cecha”?

- Proste przełożenie jednego genu na jedną cechę fenotypową (jak u Mendla) zdarza się rzadko
- Na powstanie wielu cech wpływają interakcję wielu różnych genów
- Powstają złożone sieci współzależności – złożoność budowana przez oddziaływania i kombinacje, a nie liczbę elementów składowych

Nakładanie się czynników ryzyka



Figure 3 | **Overlap of genetic risk factor loci for common diseases.** A surprising finding of genome-wide association

Human genetic variation and its contribution to complex traits

Kelly A. Frazer, Sarah S. Murray, Nicholas J. Schork and Eric J. Topol

Nat Rev Genet, 2009 vol. 10 (4) pp. 241-251

Na przykład wzrost

- W determinowaniu wzrostu człowieka bierze udział około 150 genów

Defekty a zmienność prawidłowa

- Achondroplazja
- Mutacja pojedynczego genu *FGFR3* u człowieka
- cecha mendlowska, dominująca (letalna u homozygot)
- niski wzrost, nieproporcjonalnie krótkie kończyny

Defekty a zmienność prawidłowa

- Czy gen *FGFR3* wystarczy do zrozumienia genetyki różnic wzrostu u ludzi?
- Nie - to nie jest cecha jednogenowa
- W odziedziczalną zmienność wzrostu zaangażowane jest conajmniej 200 genów



GIANT (Genetic Investigation of Anthropometric Traits), Lango et al. Nature. 2010 467(7317):832-8.

Defekty a zmienność prawidłowa

- To, że mutacja jakiegoś pojedynczego genu całkowicie zaburza działanie jakiegoś systemu nie oznacza, że
  - jest on jedynym czynnikiem odpowiadającym za ten system
  - odgrywa on istotną rolę w prawidłowej (populacyjnej) zmienności tej cechy

Przyszłość

- Nie badania asocjacji pojedynczych loci

- Badanie na skalę całego genomu, dla wielu loci

A Comprehensive Genetic Approach for Improving Prediction of Skin Cancer Risk in Humans

Ana I. Vazquez,*,[1] Gustavo de los Campos,* Yann C. Klimentidis,* Guilherme J. M. Rosa,[†] Daniel Gianola,[†] Nengjun Yi,* and David B. Allison*

*Section on Statistical Genetics, Department of Biostatistics, University of Alabama, Birmingham, Alabama 35294, and [†]Department of Animal Sciences, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin 53705

Genetics, Vol. 192, 1493–1502 December 2012



Figure 2 (A) First (*x*-axis) and second (*y*-axis) principal components eigenvectors derived from 1000 ethnicity-informative SNPs (red dots correspond to subjects that developed skin cancer, and gray

Analiza głównych składowych

Analiza dla wielu loci

- Współczynnik ryzyka wczesnej choroby wieńcowej na podstawie analizy 182 znanych zasocjowanych polimorfizmów
- Jednoznaczna predykcja tylko dla skrajnych wartości



Figure 1. Distribution of genetic risk score based on the presence of 182 independent variants associated with coronary artery disease (GRS182) in the UK Biobank cohort according to early-onset coronary artery disease (EOCAD) status.

Circ Genom Precis Med. 2018;11:e001849. DOI: 10.1161/CIRCGEN.117.001849

Sztuczna inteligencja

- Podejście wykorzystujące uczenie maszynowe (*machine learning*) na dużych zbiorach danych
- Przykład: predykcja cech wyglądu twarzy na podstawie sekwencji całogenomowych
- Czy to koniec nauki?
  - predykcja działa, ale nie rozumiemy więcej, niż dotychczas





Identification of individuals by trait prediction using whole-genome sequencing data

Christoph Lippert[a,1], Riccardo Sabatini[a], M. Cyrus Maher[a], Eun Yong Kang[a], Seunghak Lee[a], Okan Arikan[a], Alena Harley[a], Axel Bernal[a], Peter Garst[a], Victor Lavrenko[a], Ken Yocum[a], Theodore Wong[a], Mingfu Zhu[a], Wen-Yun Yang[a], Chris Chang[a], Tim Lu[b], Charlie W. H. Lee[b], Barry Hicks[a], Smriti Ramakrishnan[a], Haibao Tang[a], Chao Xie[c], Jason Piper[c], Suzanne Brewerton[c], Yaron Turpaz[b,c], Amalio Telenti[b], Rhonda K. Roby[b,d,2], Franz J. Och[a], and J. Craig Venter[b,d,1]

10166–10171 | PNAS | September 19, 2017 | vol. 114 | no. 38