Genetyka człowieka 3

Dziedziczenie wieloczynnikowe. Asocjacje i GWAS.

Asocjacja

- Nieprzypadkowe współwystępowanie czynników (alleli i fenotypów) na poziomie populacji
    - Czy zawsze asocjacja oznacza zależność przyczynową?
    - Czy każda asocjacja ma wartość diagnostyczną?
    - Czy asocjacja odkrywa “gen na ....”?

Pułapki korelacji

Korelacja zdarzeń częstych z rzadkimi

O korelacji i przyczynowości…



Populacja okolic Oldenburga, 1930-1936, za
Richard F. Mould “Introductory Medical Statistics”

O korelacji i przyczynowości…





O korelacji i przyczynowości…



Asocjacje mogą być zwodne

- Allel 3A4 cytochromu P450 (CYP3A) i rak prostaty (bardziej zaawansowana postać w momencie diagnozy)
- CYP3A może w pływać na tempo hydroksylowania testosteronu - związek przyczynowy?
- Nie ma wpływu allelu 3A4 na kinetykę metabolizmu testosteronu
- Allel 3A4 częściej występuje u ludzi pochodzenia afrykańskiego (Afroamerykanie), niż europejskiego
- Podobne korelacje dla raka prostaty dla innych alleli częstszych w populacji afrykańskiej
- Bardziej zaawansowany rak prostaty u Afroamerykanów (przyczyny społeczne)?

Problem stratyfikacji

- Jeżeli badana populacja nie jest jednorodna, to występujące ukryte zmienne mogą zafałszować wynik badań asocjacyjnych
  - czynniki etniczne
  - czynniki społeczno - ekonomiczne
  - itp.
- Skrajny przykład - paradoks Simpsona

Paradoks Simpsona

- Jeżeli zmieszamy dwie populacje, w których nie występuje asocjacja markera i choroby, ale są różne częstości występowania choroby (oraz markera), w zmieszanej populacji pojawi się asocjacja markera z chorobą (problem ukrytej zmiennej).

- Należy badać populacje jednorodne etnicznie, a nawet tylko pojedyncze duże rodziny

Paradoks Simpsona - przykład

Prosty przykład: uniwersytet powinien faworyzować kobiety przy przyjmowaniu na studia doktoranckie:

	Mężczyźni	Kobiety
Historia	1/5 (20%)	2/8 (25%)
Geografia	6/8 (75%)	4/5 (80%)
Razem	7/13 (54%)	6/13 (46%)

Przykład medyczny

Porównywano dwie terapie kamieni nerkowych

Terapia A	Terapia B
78 % (273/350)	83% (289/350)

Ale:

	Terapia A	Terapia B
Małe kamienie	93% (81/87)	87% (234/270)
Duże kamienie	73% (192/263)	69% (55/80)
Razem	78 % (273/350)	83% (289/350)

Terapię A częściej stosowano u pacjentów z dużymi kamieniami, które trudniej się leczy.

Podwójna ślepa próba

- Przy badaniach działania leków. terapii itp.
  - Terapia vs. placebo; nowa terapia vs. dotychczasowa, itp.
- Ani pacjent, ani lekarz oceniający efekty nie wie, do której grupy należy dany pacjent
- Standardy EBM (*Evidence Based Medicine*)

Asocjacje i zależności funkcjonalne

- Zależności funkcjonalne
  - często z allelami MHC (HLA) - związane z funkcjonowaniem układu odpornościowego
  - poszukuje się asocjacji dla bardzo intensywnie poznawanych polimorfizmów SNP w genomie człowieka
  - farmakogenetyka i farmakogenomika – polimorfizmy a działanie leków
    - CRHR1 (receptor kortykotropiny) - skuteczność terapii kortykosteroidami w leczeniu astmy
    - HLA-B27 - nadwrażliwość na skutki uboczne Abcaviru
    - HTR2A (serotonina 2A) - reakcja na środki antydepresyjne

Zesztywniające zapalenie stawów



Asocjacja - przykład

HLA-B27 i choroby autoimmunologiczne, np. zesztywniające zapalenie stawów

	Chorzy	Zdrowi
HLA-B27 +	90	1000
HLA-B27 -	10	9000

Ryzyko 8%

Ryzyko 0,11%

Ryzyko dla całej populacji ~1%

test statystyczny Fishera (Fisher exact test):
$p \approx 2 \cdot 10\text{-}76$

Geny na...?

Gazeta.pl Wiadomości

Szukaj w serwisie w internecie RAPORTY: E

POLITYKA | POLSKA | ŚWIAT | KULTURA | NAUKA | SPORT | PRASA | POLITBIURO | CI

Gazeta.pl ▸ Wiadomości ▸ Wiadomości dnia

A A A

Odkryto gen odpowiedzialny za choroby psychiczne

rik, IAR

2009-11-26, ostatnia aktualizacja 2009-11-26 17:15

Naukowcy odkryli gen odpowiedzialny za skłonności do chorób psychicznych. Z badań przeprowadzonych na uniwersytecie w Edynburgu wynika, że ABCA13 jest częściowo nieaktywny u pacjentów cierpiących między innymi na schizofrenię, depresję i chorobę afektywną dwubiegunową.

Fot. Jarosław Kubalski / AG

Gen reguluje te funkcje mózgu, które są zaburzone u osób chorych psychicznie. Naukowcy z Edynburga są przekonani, że to odkrycie jest przełomowe w rozumieniu przyczyn schorzeń psychicznych.

Może też pomóc w opracowaniu nowych leków i metod terapii. Odkrycie jest owocem pracy międzynarodowej grupy badawczej na uniwersytecie w Edynburgu. Naukowcy przebadali 2 tysiące pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i taką sama liczbę zdrowych osób.

ZOBACZ TAKŻE

- Likwidują ośrodek. Co się stanie z chorymi?
- Z zaburzeniami psychicznymi częściej w szpitalu

Alert24: Wyślij nam newsa, zdjęcia albo wideo! | SMS/MMS 605242424 | Czekają nagrody

Ocena: 12 głosów

Najświeższe wiadomości w Twojej komórce m.Gazeta.pl

Geny na …?

BBC | News | Sport | Weather | Capital | TV | Radio | More... | Search BBC News

NEWS LIVE BBC NEWS CHANNEL

News Front Page
Africa
Americas
Asia-Pacific
Europe
Middle East
South Asia
UK
England
Northern Ireland
Scotland
Wales
UK Politics
Education

Page last updated at 10:13 GMT, Thursday, 26 November 2009

E-mail this to a friend Printable version

'Mental illness gene' discovered by Scots scientists

Scientists have discovered a gene which may help explain the causes of mental illness.

The ABCA13 gene is partially inactive in patients with severe psychological conditions such as schizophrenia, bipolar disorder and depression.

It is hoped that identifying genes which make people more likely to develop psychiatric illness may lead to new treatments being developed.

The discovery could lead to new treatments being developed

SEE ALSO
- 'Doctors should stop pushing drugs at depressed people'
  25 Nov 09 | Health
- Physical problems 'often mental'
  14 Oct 09 | Health

RELATED BBC LINKS
- Mental Health
- Headroom

RELATED INTERNET LINKS
- Edinburgh University

A w rzeczywistości…

Copyright © 2009 The American Society of Human Genetics. All rights reserved.
The American Journal of Human Genetics, 25 November 2009
doi:10.1016/j.ajhg.2009.11.003

ARTICLE

A Cytogenetic Abnormality and Rare Coding Variants Identify *ABCA13* as a Candidate Gene in Schizophrenia, Bipolar Disorder, and Depression

Abstract

Schizophrenia and bipolar disorder are leading causes of morbidity across all populations, with heritability estimates of ~80% indicating a substantial genetic component. Population genetics and genome-wide association studies suggest an overlap of genetic risk factors between these illnesses but it is unclear how this genetic component is divided between common gene polymorphisms, rare genomic copy number variants, and rare gene sequence mutations. We report evidence that the lipid transporter gene *ABCA13* is a susceptibility factor for both schizophrenia and bipolar disorder. After the initial discovery of its disruption by a chromosome abnormality in a person with schizophrenia, we resequenced *ABCA13* exons in 100 cases with schizophrenia and 100 controls. Multiple rare coding variants were identified including one nonsense and nine missense mutations and compound heterozygosity/homozygosity in six cases. Variants were genotyped in additional schizophrenia, bipolar, depression ($n > 1600$), and control ($n > 950$) cohorts and the frequency of all rare variants combined was greater than controls in schizophrenia ($OR = 1.93$, $p = 0.0057$) and bipolar disorder ($OR = 2.71$, $p = 0.00007$). The population attributable risk of these mutations was 2.2% for schizophrenia and 4.0% for bipolar disorder. In a study of 21 families of mutation carriers, we genotyped affected and unaffected relatives and found significant linkage ($LOD = 4.3$) of rare variants with a phenotype including schizophrenia, bipolar disorder, and major depression. These data identify a candidate gene, highlight the genetic overlap between schizophrenia, bipolar disorder, and depression, and suggest that rare coding variants may contribute significantly to risk of these disorders.

Dla porównania

	Chorzy	Zdrowi
HLA-B27 +	90	1000
HLA-B27 -	10	9000

Ryzyko 8%

Ryzyko 0,11%

test statystyczny Fishera (Fisher exact test):
p≈2·10-76

$$OR = \frac{\frac{90}{1000}}{\frac{10}{9000}} = 81$$

Ważne!!

- Asocjacja to nie jest “gen na...”!
- Czynnik ryzyka nie ma zwykle znaczenia diagnostycznego
  - Może być przydatny w diagnostyce różnicowej
- Zawsze należy analizować asocjację na tle ogólnego ryzyka w populacji, jakie są wartości bezwzględne
- Asocjacje mają zwykle niewielką przydatność dla przewidywania fenotypu pojedynczych osób - to nie jest diagnostyka

Asocjacje, testy, nadużycia

- Wiele komercyjnych testów genetycznych (DTC - *Direct To Consumer*) wykorzystuje niezrozumienie różnicy między asocjacją a mutacją sprawczą
    - szkolne i wstępne kursy genetyki ograniczają się do dziedziczenia mendlowskiego

Zrobiliście listę noworocznych postanowień? Genetycy tłumaczą, dlaczego ich nie dotrzymacie

Dostępne badania:

* ciąża - pokazuje predyspozycje genetyczne w zakresie przyswajania witamin: kwasu foliowego i witaminy D. To składniki ważne dla matki i dziecka,

* otyłość - przeznaczone zarówno dla osób, które borykają się z problemem nadwagi, jak i tych, które chciałyby jej uniknąć. Sprawdza genetyczne predyspozycje do zaburzeń metabolizmu lub złych nawyków żywieniowych,

* stres - wskazane dla każdego, kto chce sprawdzić swoje predyspozycje do radzenia sobie ze stresem,

* talent - dla każdego, kto chce poznać i zrozumieć otrzymane w genach predyspozycje fizyczne, psychiczne lub intelektualne,

Choroby serca?

temu łatwo mogły określić, na co powinni uważać konkretni zawodnicy. Piłkarz Lilian Thuram zakończył karierę w 2008 roku, po tym jak badania genetyczne wykazały, że ma skłonność do chorób serca. Takie problemy miała jego matka, a brat umarł w młodym wieku na zawał serca. Stwierdził, że nie ma co ryzykować. W końcu lista piłkarzy, którzy zmarli na boisku, jest bardzo długa - mówi naukowiec. Podkreśla też, że badania genetyczne powinny być obowiązkowe. Wprowadzenie ich zaraz po urodzeniu pozwoliłoby uratować wiele osób. - Mam u siebie badania kardio, gdzie oznaczam chromosom 9, czyli rejon, który mocno wpływa na choroby serca. W Polsce każdego dnia umiera na nie 500 osób, a 100 innych ma zawał, który kończy się śmiercią. Dzięki badaniom dowiadujemy się, jak wielkie jest ryzyko wystąpienia tych chorób i jak sobie pomóc. Ludzie kupują zegarki mierzące tętno czy kroki, a nie interesują się genetyką. Przecież badania to taka wydrukowana instrukcja życia.

Choroby serca?

- Lilian Thuram choruje na rodzinną kardiomiopatię rozstrzeniową
- Forma rodzinna (genetyczna) ~50% wszystkich przypadków KR
- Obszar na chromosomie 9 - jeden z kilku powiązanych z chorobą
- Częstość KR: 1/2500 osób

Taylor i wsp. Orphanet Journal of Rare Diseases 2006 1:27 DOI: 10.1186/1750-1172-1-27

Choroby serca?

- Test chr. 9 wykrywa jeden z kilku genów stosunkowo rzadkiej genetycznej choroby serca
- Wiązanie go z zawałem (zupełnie inna choroba) i innymi częstymi chorobami serca - ????

temu łatwo mogły określić, na co powinni uważać konkretni zawodnicy. Piłkarz Lilian Thuram zakończył karierę w 2008 roku, po tym jak badania genetyczne wykazały, że ma skłonność do chorób serca. Takie problemy miała jego matka, a brat umarł w młodym wieku na zawał serca. Stwierdził, że nie ma co ryzykować. W końcu lista piłkarzy, którzy zmarli na boisku, jest bardzo długa - mówi naukowiec. Podkreśla też, że badania genetyczne powinny być obowiązkowe. Wprowadzenie ich zaraz po urodzeniu pozwoliłoby uratować wiele osób. - Mam u siebie badania kardio, gdzie oznaczam chromosom 9, czyli rejon, który mocno wpływa na choroby serca. W Polsce każdego dnia umiera na nie 500 osób, a 100 innych ma zawał, który kończy się śmiercią. Dzięki badaniom dowiadujemy się, jak wielkie jest ryzyko wystąpienia tych chorób i jak sobie pomóc. Ludzie kupują zegarki mierzące tętno czy kroki, a nie interesują się genetyką. Przecież badania to taka wydrukowana instrukcja życia.

Genetyczne czynniki ryzyka

- Badania GWAS (*Genome-Wide Association Studies*) – asocjacje na skalę genomu
- Korelacja wariantów genetycznych z ryzykiem choroby
- Znajduje się wiele korelacji, ale żadna nie może być decydującym czynnikiem
- Tajemnica brakującej odziedziczalności

Wizualizacja GWAS - Manhattan plot

Fig. 4 | Association statistics for human height.



The UK Biobank resource with deep phenotyping and genomic data

Clare Bycroft[1,13], Colin Freeman[1,13], Desislava Petkova[1,12,13], Gavin Band[1], Lloyd T. Elliott[2], Kevin Sharp[2], Allan Motyer[3], Damjan Vukcevic[3,4], Olivier Delaneau[5,6,7], Jared O'Connell[8], Adrian Cortes[1,9], Samantha Welsh[10], Alan Young[11], Mark Effingham[10], Gil McVean[1,11], Stephen Leslie[3,4], Naomi Allen[11], Peter Donnelly[1,2,14] & Jonathan Marchini[1,2,14]*

11 OCTOBER 2018 | VOL 562 | NATURE | 207

Badania asocjacji



Genome-wide association studies for complex traits: consensus, uncertainty and challenges

Mark I. McCarthy‡, Gonçalo R. Abecasis§, Lon R. Cardon*||, David B. Goldstein¶, Julian Little#, John P. A. Ioannidis**‡‡ and Joel N. Hirschhorn§§||||¶¶*

Nat Rev Genet, 2008 vol. 9 (5) pp. 356-369

Powtarzalność badań asocjacji

TABLE 26.2. How replicable are association studies?

Associated Gene, Phenotype	Number of Studies (Total)	Number of Studies ($p < 0.05$) Same Direction as Original Report	Number of Studies ($p < 0.05$) Opposite Direction as Original Report
ABCC8, type 2 diabetes[a]	9	1	1
***ABCC8*, type 2 diabetes**[a]	**4**	**2**	**0**
***ADD1*, hypertension**	**18**	**5**	**2**
APOE, schizophrenia	12	0	1
BLMH, Alzheimer's disease	5	0	0
***COL1A1*, osteoporotic fracture**	**12**	**5**	**0**
COMT, bipolar disorder	12	0	0
COMT, schizophrenia	9	0	1
***CTLA4*, type 1 diabetes**	**20**	**8**	**0**
***DRD2*, schizophrenia**	**8**	**2**	**1**
***DRD3*, schizophrenia**	**48**	**5**	**2**
GSTM1, breast cancer	15	0	0
***GSTM1*, head/neck cancer**	**25**	**3**	**1**
GYS1, type 2 diabetes	3	0	1
***HTR2A*, schizophrenia**	**28**	**3**	**1**
INSR, type 2 diabetes	4	1	0
INSR, type 2 diabetes	4	0	0
KCNJ11, type 2 diabetes	6	0	0
NTF3, schizophrenia	7	0	0
***PON1*, coronary artery disease**	**14**	**5**	**0**
***PPARG*, type 2 diabetes**	**14**	**4**	**1**
SERPINE1, myocardial infarction	13	1	0
***SLCA1*, type 2 diabetes**	**3**	**2**	**0**
SLCA2, type 2 diabetes	3	0	0
TPH, bipolar disorder	5	0	0
Total	**301**	**47**	**12**

Evolution © 2007 Cold Spring Harbor Laboratory Press

Luka odziedziczalności

- “Missing heritability”
- Klasyczne badania wykazują znaczną odziedziczalność wielu cech wieloczynnikowych
- Badania asocjacyjne wykazują jedynie niewielki wzrost prawdopodobieństwa dla danego polimorfizmu (np. badania asocjacji tłumaczą tylko 5% różnic wzrostu)
- Za odziedziczalność złożonych cech wieloczynnikowych odpowiadają interakcje genetyczne wielu polimorfizmów

Zmienność liczby kopii

- Niekiedy dotyczy obszarów zawierających geny
- Ludzie o diecie wysokoskrobiowej - więcej kopii genu kodującego enzym rozkładający skrobię (amylaza, gen *AMY1*) w porównaniu z ludźmi o diecie niskoskrobiowej

Wielogenowe czynniki ryzyka - nowa nadzieja

- GPS - *Genome-wide Polygenic Scores*/ PRS (*Polygenic Risk Scores*)
- Łączy pojedyncze asocjacje, z których każda ma nieznaczny wpływ na fenotyp
- Analiza LDpred - uwzględnia wszystkie znane SNP, waga zależna od asocjacji

SNP	Increasing allele	Allele 1	Allele 2	Genotypic score	Correlation with trait	Weighted genotypic score
SNP 1	T	A	T	1	0.005	0.005
SNP 2	C	G	G	0	0.004	0.000
SNP 3	A	A	A	2	0.003	0.006
SNP 4	G	C	G	1	0.003	0.003
SNP 5	G	C	C	0	0.003	0.000
SNP 6	T	A	T	1	0.002	0.002
SNP 7	C	C	G	1	0.002	0.002
SNP 8	A	A	A	2	0.002	0.004
SNP 9	A	T	T	0	0.001	0.000
SNP 10	C	C	G	1	0.001	0.001
Polygenic score				**9**		**0.023**

The new genetics of intelligence

Robert Plomin[1] and Sophie von Stumm[2]

NATURE REVIEWS | GENETICS VOLUME 19 | MARCH 2018 | 159

Wielogenowe czynniki ryzyka

- Współczynnik ryzyka wczesnej choroby wieńcowej na podstawie analizy 182 znanych zasocjowanych polimorfizmów
- Jednoznaczna predykcja tylko dla skrajnych wartości
- To nadal nie jest diagnostyka, ale może się przydać w identyfikowaniu grup największego ryzyka



Figure 1. Distribution of genetic risk score based on the presence of 182 independent variants associated with coronary artery disease (GRS182) in the UK Biobank cohort according to early-onset coronary artery disease (EOCAD) status.

Circ Genom Precis Med. 2018;11:e001849. DOI: 10.1161/CIRCGEN.117.001849

Choroba wieńcowa

- CAD (*Coronary Arterial Disease*)
- ~60 000 chorych, ~ 120 000 kontroli (UK Biobank)
- 6 630 150 SNP

Genome-wide polygenic scores for common diseases identify individuals with risk equivalent to monogenic mutations

Amit V. Khera[1,2,3,4,5], Mark Chaffin[4,5], Krishna G. Aragam[1,2,3,4], Mary E. Haas[4], Carolina Roselli[4], Seung Hoan Choi[4], Pradeep Natarajan[2,3,4], Eric S. Lander[4], Steven A. Lubitz[2,3,4], Patrick T. Ellinor[2,3,4] and Sekar Kathiresan[1,2,3,4]*

NATURE GENETICS | VOL 50 | SEPTEMBER 2018 | 1219–1224



Fig. 2 | Risk for CAD according to GPS. a, Distribution of GPS_{CAD} in the UK Biobank testing dataset ($n = 288{,}978$). The x axis represents GPS_{CAD}, with values scaled to a mean of 0 and a standard deviation of 1 to facilitate interpretation. Shading reflects the proportion of the population with three-, four-, and

Stratyfikacja ryzyka

- Bardzo znaczny wzrost ryzyka u stosunkowo nielicznej grupy o wysokim GPS/PRS

High GPS definition	Reference group	Odds ratio	95% CI
CAD			
Top 20% of distribution	Remaining 80%	2.55	2.43–2.67
Top 10% of distribution	Remaining 90%	2.89	2.74–3.05
Top 5% of distribution	Remaining 95%	3.34	3.12–3.58
Top 1% of distribution	Remaining 99%	4.83	4.25–5.46
Top 0.5% of distribution	Remaining 99.5%	5.17	4.34–6.12

Genome-wide polygenic scores for common diseases identify individuals with risk equivalent to monogenic mutations

Amit V. Khera[1,2,3,4,5], Mark Chaffin[4,5], Krishna G. Aragam[1,2,3,4], Mary E. Haas[4], Carolina Roselli[4], Seung Hoan Choi[4], Pradeep Natarajan[2,3,4], Eric S. Lander[4], Steven A. Lubitz[2,3,4], Patrick T. Ellinor[2,3,4] and Sekar Kathiresan[1,2,3,4*]

NATURE GENETICS | VOL 50 | SEPTEMBER 2018 | 1219–1224

Inne choroby

- Dla 4 innych badanych chorób podobny przebieg krzywej
  - (a) migotanie przedsionków, (b) cukrzyca typu 2, (c) nieswoiste zapalenie jelit, (d) rak piersi
- Dla diagnostyki i profilaktyki istotne osoby z górnych percentyli rozkładu GPS/PRS

Genome-wide polygenic scores for common diseases identify individuals with risk equivalent to monogenic mutations

Amit V. Khera[1,2,3,4,5], Mark Chaffin[4,5], Krishna G. Aragam[1,2,3,4], Mary E. Haas[4], Carolina Roselli[4], Seung Hoan Choi[4], Pradeep Natarajan[2,3,4], Eric S. Lander[4], Steven A. Lubitz[2,3,4], Patrick T. Ellinor[2,3,4] and Sekar Kathiresan[1,2,3,4*]

NATURE GENETICS | VOL 50 | SEPTEMBER 2018 | 1219–1224



Wielkość próby

- Analizy typu GWAS/GPS wyjaśniają zmienność dopiero przy zebraniu danych z bardzo licznych grup
- Analiza dziedziczenia wieloczynnikowego wymaga dużych prób!
- W odróżnieniu od jednogenowych mutacji sprawczych (gdzie czasami wystarcza jedna rodzina)



The new genetics of intelligence

Robert Plomin[1] and Sophie von Stumm[2]

NATURE REVIEWS | GENETICS VOLUME 19 | MARCH 2018 | 159

Nadal brakująca odziedziczalność

- Dla inteligencji odziedziczalność szacowana na ~50%
- Odziedziczalność zależna od SNP ~25%
  - maksimum, które można wyjaśnić GPS
  - Obecnie ~10%



The new genetics of intelligence

Robert Plomin[1] and Sophie von Stumm[2]

NATURE REVIEWS | GENETICS VOLUME 19 | MARCH 2018 | 159

To nadal nie jest diagnostyka

- Zależność wyników w nauce (test GCSE) od GPS dla inteligencji
- Nakładanie się rozkładów GCSE dla najwyższego i najniższego decyla GPS:





The new genetics of intelligence

Robert Plomin[1] and Sophie von Stumm[2]

NATURE REVIEWS | GENETICS VOLUME 19 | MARCH 2018 | 159

Ryzyko środowiskowe i genetyczne



The personal and clinical utility of polygenic risk scores

Ali Torkamani[1,2], Nathan E. Wineinger[1,2] and Eric J. Topol[1,3]*

Stratyfikacja ryzyka



Względne ryzyko podobne w modelu A i B, ale model B lepiej stratyfikuje

PRS w badaniach przesiewowych

- Zastosowanie PRS obok standardowych metod może poprawić dodatnią wartość predykcyjną badań przesiewowych
- Np. dodatnia wartość predykcyjna testu PSA dla raka prostaty w populacji tp ~12,5% (duża częstość wyników fałszywie pozytywnych)
- Test PSA na grupie górnych 5% PRS ma dodatnią wartość predykcyjną ~25%

Problemy z PRS

- Nierówna reprezentacja różnych populacji
- Nadreprezentowane populacje Europy i USA, rejonów z dobrą opieką zdrowotną
- Opracowane na tych danych PRS nie działają w innych populacjach (np. Afryki)
- Czy obserwowany efekt ma podłoże biologiczne?

Clinical use of current polygenic risk scores may exacerbate health disparities

Alicia R. Martin[1,2,3]*, Masahiro Kanai[1,2,3,4,5], Yoichiro Kamatani[5,6], Yukinori Okada[5,7,8], Benjamin M. Neale[1,2,3] and Mark J. Daly[1,2,3,9]

NATURE GENETICS | VOL 51 | APRIL 2019 | 584–591 | www.nature.com/naturegenetics





Fig. 3 | Prediction accuracy relative to European-ancestry individuals across 17 quantitative traits and 5 continental populations in the UKBB. All

Problemy z PRS

- Artefakty statystyczne związane ze stratyfikacją populacji i czynnikami środowiskowymi
- Ponowna analiza PRS dla wzrostu na większej próbie (UK BioBank)
- Nie potwierdziły wcześniejszych doniesień o korelacji PRS wzrostu z pozycją geograficzną w Europie
- Różnice (np. wyższy średni wzrost na północy Europy, niż na południu) mogą mieć podłoże środowiskowe

Reduced signal for polygenic adaptation of height in UK Biobank

Jeremy J Berg[1†*], Arbel Harpak[1,2†], Nasa Sinnott-Armstrong[3†], Anja Moltke Joergensen[4], Hakhamanesh Mostafavi[1], Yair Field[3], Evan August Boyle[3], Xinjun Zhang[5], Fernando Racimo[4], Jonathan K Pritchard[2,6*], Graham Coop[7,8*]

Berg *et al.* eLife 2019;8:e39725. DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.39725



Problemy z PRS

- Artefakty statystyczne związane ze stratyfikacją populacji i czynnikami środowiskowymi
- Ponowna analiza PRS dla wzrostu na większej próbie (UK BioBank)
- Nie potwierdziły wcześniejszych doniesień o korelacji PRS wzrostu z pozycją geograficzną w Europie
- Różnice (np. wyższy średni wzrost na północy Europy, niż na południu) mogą mieć podłoże środowiskowe

Polygenic adaptation on height is overestimated due to uncorrected stratification in genome-wide association studies

Mashaal Sohail[1,2,3†§*], Robert M Maier[3,4,5†*], Andrea Ganna[3,4,5,6,7], Alex Bloemendal[3,4,5], Alicia R Martin[3,4,5], Michael C Turchin[8,9], Charleston WK Chiang[10], Joel Hirschhorn[3,11,12], Mark J Daly[3,4,5,7], Nick Patterson[3,13], Benjamin Neale[3,4,5‡*], Iain Mathieson[14‡*], David Reich[3,13,15‡*], Shamil R Sunyaev[2,3,16‡*]

Sohail *et al.* eLife 2019;8:e39702. DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.39702



Sztuczna inteligencja

- Podejście wykorzystujące uczenie maszynowe (*machine learning*) na dużych zbiorach danych
- Przykład: predykcja cech wyglądu twarzy na podstawie sekwencji całogenomowych
- Czy to koniec nauki?
  - predykcja działa, ale nie rozumiemy więcej, niż dotychczas



Identification of individuals by trait prediction using whole-genome sequencing data

Christoph Lippert[a,1], Riccardo Sabatini[a], M. Cyrus Maher[a], Eun Yong Kang[a], Seunghak Lee[a], Okan Arikan[a], Alena Harley[a], Axel Bernal[a], Peter Garst[a], Victor Lavrenko[a], Ken Yocum[a], Theodore Wong[a], Mingfu Zhu[a], Wen-Yun Yang[a], Chris Chang[a], Tim Lu[b], Charlie W. H. Lee[b], Barry Hicks[a], Smriti Ramakrishnan[a], Haibao Tang[a], Chao Xie[c], Jason Piper[c], Suzanne Brewerton[c], Yaron Turpaz[b,c], Amalio Telenti[b], Rhonda K. Roby[b,d,2], Franz J. Och[a], and J. Craig Venter[b,d,1]

10166–10171 | PNAS | September 19, 2017 | vol. 114 | no. 38